

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ИНФЛЮЦИД / Influid®

Регистрационный номер: П N013519/02 от 23.10.2009

Торговое название препарата

ИНФЛЮЦИД

Лекарственная форма

таблетки для рассасывания

Состав (на 1 таблетку)

активные компоненты: Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D3 - 25 мг, Gelsemium sempervirens (Gelsemium) (Гельземиум семпервиренс (гельземиум)) D3 - 25 мг, Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) (цефалис ипекакуана (ипекакуана)) D3 - 25 мг, Phosphorus (фосфорус) D5 - 25 мг, Bryonia (бриония) D2 – 25 мг, Eupatorium perfoliatum (эупаториум перфолиатум) D1 - 25 мг;

вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, магния стеарат.

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, белого цвета с легким желтоватым оттенком, с фаской, иногда с отдельными тёмными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Применяется для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; непереносимость крахмала; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Детский возраст до 3 лет по причине недостаточности клинических данных.

Применение при беременности и в период лактации

Во время беременности и в период лактации принимать препарат только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая их в полости рта.

Детям до 5 лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде, под язык.

При остром заболевании:

Детям от 3 до 6 лет следует принимать по 1 таблетке каждые 2 часа (не более 6 раз в день) до наступления улучшения, при дальнейшем лечении по 1/2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления.

Детям от 6 до 12 лет следует принимать по 1 таблетке каждый час (не более 7-8 раз в день) до наступления улучшения, при дальнейшем лечении по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

Детям старше 12 лет и взрослым принимать по 1 таблетке каждый час (не более 12 раз в день) до наступления улучшения, далее по 1-2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления.

Для профилактики респираторно-вирусной инфекции:

Детям от 3 до 6 лет следует принимать по 1/2 таблетки 2 раза в день.

Детям от 6 до 12 лет – по 1 таблетке 2 раза в день.

Детям старше 12 лет и взрослым следует принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

Профилактическое применение проводят в течение всего времени, пока в окружении находятся люди с симптомами респираторно-вирусной инфекции.

В случае отсутствия улучшения *при остром заболевании* по истечении 2 дней лечения Инфлюцидом, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Приём гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат можно применять больным с целиакией.

Пациентам с непереносимостью крахмала (заболеванием, отличным от целиакии) не следует принимать Инфлюцид, поскольку в нем содержится пшеничный крахмал.

Таким пациентам рекомендуется применение препарата в форме капель.

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, необходимо учитывать, что максимальная суточная доза при острых состояниях составляет 12 таблеток, что соответствует 0,25 хлебной единицы (ХЕ).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания. По 20 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и пленки ПВХ. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С, в сухом месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности препарата.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-
Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе, 24
тел. +49 / 721 / 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse, 24
tel. +49 / 721 / 40 93 236

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ,
Вильмар Швабе Штрассе, 4,
Карлсруэ, 76227 Германия

Представительство в России / Организация, принимающая претензии потребителей

117513 Москва, ул.Островитянова, д.6
тел.: (495) 225-71-21